

## JABUKA

FAZA TRETIRANJA	PROIZVOD/DOZA	NAMJENA	NAPOMENA
1. Kretanje vegetacije	Cupra	3,0 l krastavost	Vizualnim pregledom utvrditi prisustvo jaja grinja, jaja lisnih uši kao i kalifornijske štitaste uši.
	Fito Film	0,5 l zimska jaja štetnika	
2. Otvaranje pupa	Cupra	2,0 l krastavost	Primjena ulja u ovoj fenofazi, daje jako dobru efikasnost u suzbijanju štetnika. Aplikacijom suzbijamo prezimljujuće oblike štetnika (krvava uš, kalifornijska štitasta uš, crveni vočni pauk).
	Fito Film	0,3 l zimska jaja štetnika	
3. Otvoreni pup	Cupra	1,0 l krastavost	Proizvod FitoHeliosulfre je odličan za preventivno ali i kurativno suzbijanje pepelnice, kao i za suzbijanje zimskih jaja štetnika.
	FitoHeliosulfre	3,0 l sumpor+ljepilo	
	FitoOrganamax	2,0 l NPK gnojivo+ mikroelementi	
4. Ružičasti pup	FitoMil L-60	2,5 l krastavost	Mikroelement bor bitan je za klijavost polena i za bolju oplodnju.
	FitoBor	1,5 l bor za bolju oplodnju	
	FitoOrganamax	3,0 l NPK + mikroelementi	
5. Početak cvatnje	<u>Izdvojeni tretman</u>		Pratiti pojavu štetnika, preporuka je postavljanje feromonskih klopki.
	FitoDimel	2,5 l cvjetojed, lisne uši	
	FitoMite	2,5 l	
5. Početak cvatnje	FitoMil L-60	1,5 l krastavost	
	FitoFert sumpor + Zymex	3,0 l pepelnica 1,5 l	

	<b>FitoMax L-90</b>	<b>1,0 l</b>	
<b>6. Puna cvatnja</b>	<b>FitoMil L-60</b>	<b>1,5 l</b>	krastavost
	<b>FitoAlgen F</b>	<b>1,5 l</b>	ekstrakt morskih algi, biostimulator
	<b>Fusver</b>	<b>2,0 l</b>	pepelnica, bakterijska palež
<b>7. Nakon cvatnje, opadanje latica</b>	<b>FitoMil L-60</b>	<b>2,0 l</b>	krastavost ploda
	<b>FitoHeliosulfre</b>	<b>2,0 l</b>	pepelnica
	<b>+ Zymex</b>	<b>1,0 l</b>	
	<b>Baturad WP</b>	<b>1,0 kg</b>	savijač
<b>8. Prvo nakon cvatnje</b>	<b>Fito-Kaolin</b>	<b>10,0 kg</b>	krastavost ploda
	<b>FitoHeliosulfre</b>	<b>3,0 l</b>	Pepelnica, krastavost
	<b>Baturad WP</b>	<b>0,75 kg</b>	savijač
<b>9. Drugo nakon cvatnje</b>	<b>FitoMil L-60</b>	<b>2,5 l</b>	krastavost ploda
	<b>FitoHeliosulfre</b>	<b>3,0 l</b>	pepelnica
	<b>Baturad WP</b>	<b>0,75 kg</b>	savijač
	<u>Izdvojeni tretman:</u>		NPK + mikroelementi
	<b>FitoOrganomax</b>	<b>5,0 l</b>	
<b>10. Treće nakon cvatnje</b>	<b>Fito-Kaolin</b>	<b>5,0 kg</b>	krastavost ploda

U slučaju pojave lisnih uši i cvjetojeda, odraditi odvojeni tretman FITOMITE 2,0 l/ha + FITODIMEL 2,5 l/ha

FitoOrganomax je ekološko gnojivo 6-2-4, može se primjenjivati folijarno ili kroz sustav za fertirigaciju. Preporuka je da se kroz vegetaciju primjeni 15-20 l/ha u odvojenim tretmanima po 5 l/ha.

Tretiranja provoditi u razmaku do 7 dana.

Pratiti pojavu odraslih oblika pauka, i u slučaju potrebe za suzbijanjem, primjeniti sredstvo **FitoMite** u dozi 3,0 l/ha.

**FitoMite** je prirodni preparat za suzbijanje ličinki i odraslih oblika pauka.

	<b>FitoHeliosulfre</b> <b>2,0 l</b>	pepelnica	Ako zaštita od savijača nije bila efikasna, u ovom periodu se već mogu uočiti ubušenja gusjenica što se može ustanoviti pregledom 25 do 50 plodova ubranih na više pozicija u voćnjaku.
	<b>Baturad WP</b> <b>0,75 kg</b>	savijač	
	<b>Shigeki</b> <b>2,0 l</b>	aminokiseline iz morskih algi + PK	
<b>11. Prvo ljetno tretiranje</b>	<b>FitoMil L-60</b> <b>2,5 l</b>	krastavost	
	<b>FitoHeliosulfre</b> <b>3,0 l</b>	sumpor+ljepilo	
	<b>Baturad WP</b> <b>0,6 kg</b>	savijač	
<b>12. Drugo ljetno</b>	<b>Chromosul 80</b> <b>2,5 kg</b>	pepelnica	Voćnjake u lošoj kondiciji treba pregledati na prisutnost potkornjaka. Vizualnim pregledima se nastavlja praćenje brojnosti grinja i njihovih prirodnih neprijatelja.
	<b>Fito-Kaolin</b> <b>3,0 kg</b>	krastavost	
	<b>FitoMite</b> <b>2,0 l</b>	pauk, savijač	
	<b>+ FitoDimel</b> <b>2,0 l</b>		
	<b>Kaishi</b> <b>2,0 l</b>	aminokiseline + PK gnojivo	
<b>13. Pred berbu 10 dana</b>	<b>FitoMil L-60</b> <b>2,5 l</b>	krastavost, skladišne	Tretiranje s ciljem povećanja skladišnih sposobnosti.
	<b>Fito-Kaolin</b> <b>3,0 kg</b>	skladišne bolesti	
	<b>Baturad WP</b> <b>0,6 kg</b>	savijač	
	<b>FitoDimel</b> <b>2,5 l</b>	okvašivač	
<b>14. Nakon berbe</b>	<b>FitoLabicuper</b> <b>2,5 l</b>	krastavost	
<b>(20 dana prije mraza)</b>	<b>FitoBor</b> <b>2,0 l</b>	akumulacija bora za iduću sezonu	

## Napomene:

- U razdoblju nakon cvatnje pa do kraja lipnja pratiti vremenske prilike, i u slučaju oborina preko 25 mm, **obavezno ponoviti prethodni tretman**. Broj tretmana ovisi o količini oborina i vremenskim uvjetima.
- Za suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti (monilija, pepelnica, erwinia itd.) preporučujemo primjenu preparata **Fusver** u dozi 2,5-3,0 l/ha. Proizvod **Fusver** je preparat na bazi bakterije *Bacillus subtilis* i potpuno je prirodni proizvod koji nema karencu i ne ostavlja rezidue. U praksi je pokazao jako dobru učinkovitost u suzbijanju biljnih bolesti.

## UČINKOVITOST TRETIRANJA JABUKE PO FAZAMA RAZVOJA

Bolesti	Jesen	Kretanje vegetacije	Vunasti pup	Ružičasti pup	Opadanje latica
Krastavost	++	++	+++	+++	+++
Pepelnica	----	----	----	+++	+++
Bakterijska palež	----	----	----	+++	+++

**Učinkovitost:** +++ jako učinkovito, ++ umjерено učinkovito, --- slabo učinkovito