

FAZA TRETIRANJA	PROIZVOD/DOZA	NAMJENA
1. Mirovanje i početak cvatnje (temperature iznad 7°C)	Cupra 2,0 l	bakterioze
	Fito Film 0,5 l	zimski jaja štetnika
2. Rast izdanaka (travanj)	FitoMil L-60 2,5 l	pjegavost lista, <i>Anisogramma anomala</i>
	Fito Organomax 3,0 l	NPK + mikroelementi
	FitoAlgen F 1,5 l	aminokiseline + biljni hormoni (morske alge)
	FitoDimel 2,0 l	okvašivač
3. Sredina srpnja	FitoMil L-60 2,5 l	pjegavost lista, bakterioze
	Fusver 2,5 l	bolesti lista, trulež plodova
	Fito Organomax 3,0 l	NPK + mikroelementi
IZDVOJENI TRETMAN:		
	Baturad WP 1,0 kg	gusjenice
	FitoMite 2,5 l	ljeskotoč, pauk, uši
	FitoDimel 2,0 l	
4. Početak lipnja	FitoMil L-60 2,5 l	pjegavost lista,
	FitoMite 2,5 l + FitoDimel 2,0 l	štetnici
	Fusver 2,0 l	trulež plodova, bolesti lista
5. Kraj lipnja	FitoMil L-60 2,5 l + FitoFert Sumpor 3,0 l	pepelnica, siva plijesan

	FitoMite	2,5 l	pauk
	FitoDimel	2,0 l	okvašivač
	Shigeki	2,0 l	organsko gnojivo PK + mikroelementi + aminkiseline od algi
	Fusver	2,0 l	trulež plodova, bolje čuvanje
6. Nakon berbe	FitoMax L-90	2,5 l	bakterioze
	FitoBor	1,5 l	gnojivo na bazi bora za bolju klijavost polena

Napomene:

- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je izvršiti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke. Preporučujemo - **FitoAlgen F** (aminokiseline iz morskih algi) 2,0 l/ha ili **Fitofert LMW** (organsko gnojivo s aminokiselinama) 2,5 – 3,5 l/ha, **Kaishi** 1,5-2,0 l/ha (koncentrirane aminokiseline) ili **Shigeki** 1,5 l/ha.
- Pratiti razvoj štetnika i po potrebi za suzbijanje štetnih gusjenica tretirati sa sredstvom **Baturad WP** u dozi 1,0 kg/ha.
- Za suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti (monilija, pepelnica, erwinia itd.) preporučujemo primjenu preparata **Fusver** u dozi 2,5 – 4,0 l/ha. Proizvod **Fusver** je preparat na bazi bakterije *Bacillus subtilis* i potpuno je prirodni proizvod koji nema karencu i ne ostavlja rezidue. U praksi je pokazao jako dobru učinkovitost u suzbijanju biljnih bolesti.