

MASLINA

FAZA TRETIRANJA	NAMJENA		
1. Kretanje vegetacije BBCH 00-37 Ožujak	Cupra	2,5 l	paunovo oko, rak masline
	FitoDimel	1,0 l	okvašivač
2. Prije cvatnje BBCH 50-59 Travanj-svibanj	FitoMil L-60	2,5 l	paunovo oko
	FitoBor	2,0 l	bor za bolju oplodnju
	Kaishi	1,5 l	aminokiseline
	Baturad WP	1,0 kg	maslinin moljac
3. Cvatnja BBCH 60-68 Svibanj	FitoBor	2,0 l	bor za bolju oplodnju, klijavost polena
	FitoOlivo plus	2,5 l	kompleksno gnojivo za potpunu ishranu
4. Zametnuti plodovi – završetak cvatnje BBCH 69 – 71 Lipanj	FitoFert Sumpor	2,5 l	aminokiseline sa sumporom
	Baturad WP	1,0 kg	maslinin moljac
	FitoDimel	2,0 l	okvašivač
5. Veličina ploda 8-10 mm Lipanj	FitoMil L-60	1,5 l	bakterioza
	FitoFert Sumpor	3,0 l	aminokiseline sa sumporom
	FitoMite + FitoDimel	2,0 l 2,0 l	maslinin svrdlaš
6. Plod 90% konačne veličine BBCH 75 – 79 Rujan	FitoMil L-60	2,5 l	paunovo oko
	FitoOlivo Plus	2,5 l	mikro i makroelementi + aminokiseline
	Success Bait	1,5 l	maslinina muha
7. Prije berbe, promjena boje ploda BBCH 80 – 89	FitoMil L-60	2,5 l	paunovo oko
	Fitofert Sumpor	2,5 l	sumpor + aminokiseline

Listopad	Succes Bait	1,5 l	maslinina muha
	FitoDimel	2,5 l	okvašivač
8. nakon berbe	FitoMax L-90	3,0 l	bakterioze, sušenje masline

**Sušenje masline
uzrokovano gljivicom
Verticillium dahliae
Kleb.**

1. U kretanju vegetacije: FitoMax L-90 3,5 l/ha
2. Nakon 21 dan, kroz sustav kap na kap: FitoMil L-60 4,0 l/ha
3. Krajem srpnja: FitoMil L-60 4,0 l/ha
4. U rujnu: FitoMax L-90 3,0 l/ha

Napomene:

- U slučaju stresnih uvjeta izazvanih sušom, mrazom ili tučom potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F** 2,0 l/ha (aminokiseline iz morskih algi) ili **Fitofert LMW** 2,5-3,0 l/ha (organsko gnojivo s aminokiselinama), **Kaishi** 1,5 l/ha (koncentrirane aminokiseline) ili **Shigeki** 1,5 l/ha.
- Protiv maslinove muhe potrebna su 2-4 tretmana sredstvom **Fito-Kaolin TMB**. Prvo tretiranje treba obaviti u vrijeme razvoja koštice (kraj lipnja). Tretman ponoviti u intervalu od 30 dana u dozi 3-5 kg/100 l vode. **Fito-Kaolin TMB** djeluje kao mehanička prepreka, mijenja boju plodu, te takav plod prestaje biti atraktivan za štetnika.
- U suzbijanju svrdlaša jako dobre rezultate pokazao je tretman **FitoAfiser** 2,5 l/ha + **FitoDimel** 2,5 l/ha u kombinaciji. Bitno je da se tretman obavi u blok metodi, što znači da se ponovi isti tretman u roku 10-14 dana.
- Za suzbijanje raka masline preporuka je da se u tretiranje uvrsti i sredstvo **Fusver** u dozi 2,5 – 3,0 l/ha. Tretiranje s preparatom **Fusver** treba izmjenjivati s **FitoMil L-60**, i tretirati odvojeno.
- **Fusver** je preparat na bazi bakterije *Bacillus subtilis* pa je preporuka da se tretira odvojeno od sredstava koja sadrže bakar. Tretiranja obaviti u razmacima 7-10 dana naizmjenično **FitoMil L-60** a zatim **Fusver**.