

FAZA TRETIRANJA	PROIZVOD/DOZA	NAMJENA	NAPOMENA
U fazi butonizacije do pred cvatnju BBCH 31-57	FitoMil L-60 2,5 l	Siva, crna i koncentrična pjegavost	Pimijeniti 2 puta u tijeku jedne vegetacijske sezone.
Od faze intenzivnog porasta BBCH 32	FitoOrganomax 3,0-5,0 l	Pospješuje razvoj lisne mase, povećava broj zrna u glavici, povećava hektolitarsku masu.	Moguće primijeniti 2-3 puta u vegetacijskoj sezoni.
U fazi četiri lista BBCH 14	Fitofert sumpor 3,0 l	<p> Pozitivno utječe na metabolizam biljke. Pospješuje sintezu masnih kiselina te povećava postotak ulja. </p>	<p> Ne primjenjivati na visokim temperaturama (>25°C). Ponoviti tretman nakon 14 dana. </p>
Primjena sa svakim tretiranjem	FitoFilm 1,0 l	<p> Pomoćno sredstvo-okvašivač, povećava djelotvornost ostalih sredstava </p>	<p> Smanjuje površinsku napetost, pojačava prijanjanje uz biljku, sprječava ispiranje. </p>

DODATNA NAPOMENA:

U slučaju pojave stresnih situacija kao npr. niske temperature, tuča, obilne kiše, sušna razdoblja i slično savjetujemo uvrštavanje jednog od pripravaka na bazi aminokiselina u tretiranje i to: **FitoAlgen 1,5-2,0 l/ha** ili **Fitofert LMW 2,5-3,5 l/ha** ili **Kaishi 1,5-2,0 l/ha**.

