

FAZA TRETIRANJA	PROIZVOD/DOZA	NAMJENA
1. Zimsko tretiranje (razmicanje ljuščica pupa)	Cupra 2,5 l	crna pjegavost
	FitoHeliosulfre 2,5 l	pepelnica
2. Dužina izboja 5-10 cm	Cupra 2,0 l	crna pjegavost, plamenjača
	FitoHeliosulfre 2,0 l	pepelnica
	FitoOrganomax 6-2-4 3,0 l	NPK gnojivo + mikroelementi
	Dodatno: Baturad WP 1,0 kg	po potrebi uvrstiti u tretman, u slučaju pojave migratornih sovica
3. Dužina izboja 20-40 cm	FitoMil L-60 1,5 l + Cupra 1,0 l	plamenjača
	FitoHeliosulfre 2,5-5,0 l	pepelnica, i po potrebi viša doza za grinje
	FitoMite 2,5 l	grinje
	FitoBor 1,0-2,0 l	gnojivo s borom (B) za bolju klijavost
4. Prije cvatnje	FitoMil L-60 1,5 l + Cupra 1,0 l	plamenjača
	Zymex 1,5 l + Sumpor WG 80 2,0 kg	pepelnica
	FitoBor 1,0 l	gnojivo s borom (B) za bolju klijavost peluda
	ODVOJENI TRETMAN: Baturad WP 1,0 kg K-Vitrum 3,0 l	groždani moljac zeleni botritis

	FitoDimel	2,0 l	okvašivač
5. Nakon cvatnje	FitoMil L-60	2,0 l	plamenjača
	+ Cupra	1,0 l	
	FitoHeliosulfre	2,0 l	pepelnica
	+ Zymex	1,0 l	
	Baturad WP	0,6 kg	moljac
	Shigeki	1,5 l	aminokiseline + PK gnojivo
6. Rast bobica	FitoMil L-60	2,5 l	plamenjača
	Sumpor WG 80	2,0 kg	pepelnica
	+ FitoFert sumpor	2,0 l	
	IZDOJENI TRETMAN:		američki cvrčak
	Abanto	0,75 l	
	FitoOrganomax 6-2-4	3,0 l	organsko gnojivo NPK + mikroelementi
7. Pred zatvaranje grozda	FitoMil L-60	2,0 l	plamenjača (kurativno i preventivno)
	+ Cupra	1,0 l	
	FitoHeliosulfre	2,5 l	pepelnica
	Kaishi	1,5 l	biostimulator, aminokiseline
	ODVOJENI TRETMAN (u zonu grozda):		botritis, pepelnica
	K-Vitrum	2,0 l	
	+ Fusver	2,0 l	
8. Šara grozda	FitoMil L-60	2,0 l	plamenjača
	+ Cupra	1,0 l	
	FitoHeliosulfre	2,0 l	pepelnica
	K-Vitrum	2,5 l	botritis

	FitoAlgen F	1,0 l	aminokiseline
9. Nakon berbe, prije opadanja lišća	FitoMax L-90	2,0	bolesti drva
	FitoBor	1,5 l	akumulacija bora za iduću vegetaciju

Napomene:

- U slučaju čestih oborina, potrebno je obaviti više puta preventivno-kurativnu zaštitu vinograda
- Kod pojave stresnih uvjeta za biljku (mraz, tuča, suša) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F** u dozi 2,0 l/ha, **Kaishi** 1,0 l/ha, **FitoFert LMW** 2,5 l/ha, **Kaishi** 2,0 l/ha
- Ako su prisutni simptomi eutipoze ili ESCA (apoplektično venuće vinove loze), nakon berbe tretirati s **FitoMax L-90** s 5,0 l/ha
- Gnojivo **FitoOrganomax 6-2-4** je prirodno ekološko gnojivo. Primjenjuje se folijarno ili fertirigacijom. Doze ovise o ishranjenosti tla, ali generalna preporuka je 20 l/ha kroz vegetaciju u 4-5 obroka.