Bugarova 16
HR-10250 Zagreb
+385 (0)1 5566 704

info@fito-eko.hr
www.fito-eko.hr

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI

GRANOTOČ – *Zeuzera pyrina*

Prikladna klopka:

✓ Delta klopka

Opis štetnika:

Leptir je dug oko 40 mm, ima bijela krila, posuta crnim i modrim pjegama Tijelo mu je duguljasto, bijelo s mnogim crnim ili modrim pjegama. Teže se primjećuje jer leti noću.
Leptir se javlja krajem lipnja pa sve do kraja kolovoza.
Nakon parenja, ženka snese od 100 do 300 jaja, u podnožju pupova vršnih mladica.
Ličinka je žute boje s tamnim kvržicama i crnom glavom, duga i do 60 mm.
Grize srž prema gore pa dio grane iznad rupe odrveni, promijeni boju i osuši se. Ubušuje se prvo u tanje, a kasnije i deblje grane u kojima na kraju i prezimljava.

Kulture:

Različite voćke - jabuke, kruške, šljive, trešnje, orah, masline, kesten, šipak, čak i vinova loza.

Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same potrebe
- Iako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Pričvrstiti feromon u već sastavljenu lovku
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.					**15.9.**			

Postavljanje klopke: Postaviti klopku s mamcem u visini očiju, 1,5-2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti za granu stabla.
Preporučuje se klopku staviti u nasad u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebna je 1 klopka po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 3 klopke u jedinstvenom nasadu/imanju.
U većim voćnjacima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: Zamijeniti svakih 6-7 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.
Ljepljivi umetak treba zamijeniti kada je površina prekrivena kukcima. Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.
Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremiti ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.