Bugarova 16
HR-10250 Zagreb
+385 (0)1 5566 704

info@fito-eko.hr
www.fito-eko.hr

UPUTE O KORIŠTENJU FEROMONSKOG MAMCA U KLOPCI

TREŠNJINA MUHA - *Rhagoletis cerasi*

Prikladna klopka:

✓ Klopka za voćne mušice

✓ Žuta ploča

Opis štetnika:

Trešnjina muha najvažniji je štetnik trešnje i višnje.
Pripada u dvokrilce, a odrasli oblik je velik 3,5 – 6 mm s uočljivim trokutastim štitićem žute boje na prsištu.
Gusjenica su bjelkaste, do 6 mm duge.
Let počinju krajem travnja i kroz svibanj, a kad srednje dnevne temperature dosegnu 20°C započinju polaganje jaja.
Ženke leglicom polažu jaja ispod epiderme ploda u kojima se razvija ličinka koja se hrani sočnim mesom ploda.
Mjesto uboda omekša i podložno je truleži te ti plodovi, ako se dalje koriste, sadrže manju količinu soka.
Prezimljuju u kukuljici u površinskom sloju tla.

Kulture:

Trešnje, višnje (maraska), dren

Upute za korištenje:

- Izvaditi feromonski mamac iz pakiranja neposredno prije same upotrebe
- Iako se ne radi o tvari koja je štetna za ljude, preporuča se koristiti rukavice prilikom postavljanja te oprati ruke prije i nakon korištenja
- Postaviti feromon na ljepljivi umetak klopke i umetnuti ga u već sastavljenu klopku ili žutu ploču
- Ne ostavljati mamce na direktnom suncu
- Omot od pakiranja odložiti u odgovarajući spremnik za otpad

Razdoblje korištenja:

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			15.4.		30.6.						

Postavljanje klopke: U klopku za voćne mušice uliti 200 ml vode i u to istresti svu smjesu iz pakiranja. Postaviti klopku za voćne mušice na 1,5 - 2 metra iznad zemlje te je dobro pričvrstiti na granu.
Preporuča se klopku staviti u voćnjak u prvoj polovici travnja, a najkasnije 15. travnja.

Broj klopki po površini: U svrhu praćenja potrebna je 1 klopka po hektaru, s tim da je preporučljivo imati po 2 klopke u jedinstvenom nasadu/imanju.
U većim voćnjacima koji imaju ujednačene uvjete broj feromonskih klopki po površini se može smanjiti u skladu s važećom zakonskom preporukom i brojem ARKOD parcela: do uključivo 2 ha 1 klopka; za 2-5 ha min 2 klopke; 5-10 ha min 3 klopke; 10-50 ha min 4 klopke; 50-100 ha min 10 klopki; >100 ha min 20 feromonskih klopki.

Zamjena mamaca: Zamijeniti svaka 8 do 10 tjedana ili prema važećim preporukama savjetodavne službe. Može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, najviše o temperaturi. Pri višim temperaturama mamce treba zamijeniti ranije.
Povremeno, ako se posuda napuni kukcima, potrebno je pokupiti kukce i očistiti klopku.
Novi feromonski mamac postaviti na isto mjesto na kojem je bio prethodni.

Pakiranje: Mamci su pakirani u vakuumskoj foliji kako bi bili zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Skladištenje: Čuvati feromonske mamce dobro zatvorene u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu, izvan direktnih sunčevih zraka.
Kako bi se sačuvalo djelovanje na duži rok, preporuča se spremiti ih u hladnjak te će u tom slučaju biti efikasni i do 24 mjeseca.