

Maslina

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena
Kretanje vegetacije (BBCH 00-37, ožujak)	Cupra	2,5 l	Paunovo oko, rak masline
	FitoDimel	1,0 l	Okvašivač
Prije cvatnje (BBCH 50-59, travanj-svibanj)	FitoMil L-60 ECO	2,5 l	Paunovo oko
	FitoBor	2,0 l	Bor za bolju oplodnju
	FitoOrganomax	3,0 l	Organsko gnojivo NPK + mikroelementi
	FitoKel Zn+Mn	2,0 kg	Cink i mangan za bolju oplodnju i diobu stanica
Cvatnja (BBCH 60-68, svibanj)	Belthirul	1,0 kg	Maslinin moljac
	FitoBor	2,0 l	Bor za bolju oplodnju, klijavost polena
	FitoOlivo plus	2,5 l	Kompleksno gnojivo za potpunu ishranu masline
Zametnuti plodovi – završetak cvatnje (BBCH 69 – 71, lipanj)	Globber	2,0 l	Biostimulator
	Belthirul	1,0 kg	Maslinin moljac
	BioVeria	0,2 kg	
	Litoman Ultra	4,0 kg	Štetnici
Veličina ploda 8-10 mm (lipanj)	Mastro 50	2,0 l	
	FitoMil L-60 ECO	2,5 l	Bakterioza
	Fito Organomax	3,0 l	Organsko gnojivo NPK + mikroelementi
	Litoman Ultra	4,0 kg	Maslinin svrdlaš
Plod 90 % konačne veličine (BBCH 75 – 79, rujanj)	BioVeria	0,2 kg	
	FitoMil L-60 ECO	2,5 l	Paunovo oko
	FitoOlivo Plus	2,5 l	Mikro i makroelementi + aminokiseline
Prije berbe, promjena boje ploda (BBCH 80 – 89, listopad)	Success Bait	1,5 l	Maslinina muha
	FitoMil L-60 ECO	2,5 l	Paunovo oko
	Shikegi	2,5 l	PK + aminokiseline
Nakon berbe (prosinac)	Succes Bait	1,5 l	Maslinina muha
	FitoDimel	2,5 l	Okvašivač
	FitoMax L-90	3,0 l	Bakterioze, sušenje masline



Uzrok	Vrijeme primjene	Proizvod	Doza
Sušenje masline uzrokovano gljivicom <i>Verticillium dahliae</i> Kleb	U kretanju vegetacije	FitoMax L-90	3,5 l/ha
	Nakon 21 dan, kroz sustav kap na kap	FitoMil L-60 ECO	4,0 l/ha
	Krajem srpnja	FitoMil L-60 ECO	4,0 l/ha
	U rujnu	FitoMax L-90	3,0 l/ha



Gnojidba:

1. Jesenska osnovna gnojidba


Ca'Verde Activa 4-3-3	400-800 kg/ha	Inkorporirati u tlo.
BeneSol 4-3-3	1000 kg/ha	Inkorporirati u tlo.
Microstart Bio NP 5-12	50-100 kg/ha	Inkorporirati u tlo.

2. Kretanje vegetacije

Bioptimus	4,0 l/ha	Aktivator tla, sadrži korisne mikroorganizme. Primijeniti fertirigacijom ili tretiranjem po tlu u trake
-----------	----------	---

! Napomena:

- U slučaju stresnih uvjeta izazvanih sušom, mrazom ili tučom potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F** 2,0 l/ha (aminokiseline iz morskih algi) ili **Amive** 1,5 – 2 l/ha (organsko gnojivo s aminokiselinama), **Kaishi** 1,5 l/ha (koncentrirane aminokiseline) ili **Shigeki** 1,5 l/ha.
- Protiv maslinove muhe potrebna su 2-4 tretmana sredstvom **Fito-Kaolin TMB**. Prvo tretiranje treba obaviti u vrijeme razvoja koštice (kraj lipnja). Tretman ponoviti u intervalu od 30 dana u dozi 3-5 kg/100 l vode. **Fito-Kaolin TMB** djeluje kao mehanička prepreka, mijenja boju plodu, te takav plod prestaje biti atraktivan za štetnika.
- U suzbijanju svrdlašja jako dobre rezultate pokazao je tretman **Litoman Ultra** 4,0 kg/ha + **Mastro 50** 2,0 l/ha u kombinaciji. Bitno je da se tretman obavi u blok metodi, što znači da se ponovi isti tretman u roku 10-14 dana.



Kretanje vegetacije

Prije cvatnje

Cvatnja

Formirani plodovi

Zrioba