

Borovnica

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena	Napomena
Mirovanje vegetacije	Fertipen Cu	2,0 l	Suzbijanje zimskih spora	Vizualnim pregledom utvrditi prisustvo jaja grinja, jaja lisnih uši kao i kalifornijske štitaste uši.
	Fito Film	1,0 l	Zimska jaja štetnika	Primijeniti veću količinu škropiva
Kretanje vegetacije (fertiligacijom)	Renov Tricco	1,0 kg	Bolesti korijena i korijenovog vrata	
Vunasti pup (kretanje vegetacije)	Litoman Ultra	4,0 kg	Crna pjegavost (<i>Phomopsis spp.</i>), antraknoza, štetnici	
	FitoDimel	1,5 l	Okvašivač	
Vidljivi listići	FitoMil L-60 Eco	1,0 l	Crna pjegavost (<i>Phomopsis spp.</i>), antraknoza	U slučaju pojave štetnih gusjenica tretirati sa pripravkom Gussan u dozi 2,0 l/ha ili Belthirul 1,0 kg/ha. Mikroelement bor bitan je za bolju klijavost polena a to znači i bolju oplodnju.
	Litoman Ultra	4,0 kg	Štetnici	
	Bramisoil	1,5 l		
	Izdvojeni tretman			
	FitoBor	1,0 l	Bor za bolju oplodnju, NPK gnojivo+ mikroelementi	
Početak cvatnje	BioEho	3,0 l	Monilija, botrytis	
	Fungisei	2,0 l	Monilija	
	FitoDimel	1,0 l	Okvašivač	
	Litoman Ultra	4,0 kg		
	Quilatam	2,0 l	Trips, lisne uši, cvjetojed	
Upotrijebite feromonske zamke za praćenje aktivnosti moljaca i točno vrijeme prskanja. Ako se zamke ne koriste, tretirati pri opadanju latica i ponoviti za 7-14 dana.				
Završetak cvatnje	Globber	2,0 l	Crna pjegavost (<i>Phomopsis spp.</i>), antraknoza, trulež	Tretman ponoviti nakon 10 dana
	Shigeki	2,0 l	Aminokiseline + PK	
	Belthirul	0,75 kg	Moljac (<i>Grapholita packardii</i>)	
Nakon cvatnje (formirani plodovi)	FitoMil L-60 Eco	2,0 l		
	K-Vitrum	2,0 l	Pjegavost, antraknoza	
	Litoman Ultra	4,0 kg	Štetnici	
Nakon cvatnje (formirani plodovi)	Quilatam	2,5 l	Lisne uši	
	FitoKel Cao	2,0 l	Čvrstoća plodova	
Ovisno o vremenskim uvjetima i stanju nasada ponoviti tretman. Pratiti pojavu štetnika. U slučaju nepovoljnih uvjeta primijeniti Shigeki 2,0 l/ha				
Pred berbu	Fungisei	2,0 l	Antraknoza, botritis, bolje čuvanje plodova	Pratiti pojavu štetnika <i>Drosophila suzukii</i> i po potrebi tretirati, suzbijanje je moguće samo kontaktno. Također pratiti pojavu moljca pomoću žutih ploča i u slučaju ulova krenuti u suzbijanje. Tretman Belthirulom (<i>Bacillus turingiensis</i>) za suzbijanje moljca ponoviti za 7 dana.
	K-Vitrum	3,0 l	Suzbijanje skladišnih bolesti	
	Prev-Gold	0,5 %	<i>Drosophila suzukii</i>	
	Belthirul ili Gussan	1,0 kg ili 2,0 l	Moljac	
Za sprečavanje pucanja plodova po potrebi tretirati sa sredstvom Hortit u dozi 2,0 - 3,0 l/ha				
Nakon berbe	FitoMax L-90	2,5 l		
	FitoMil L-60 Eco	2,5 l	Bakterioze	
	FitoBor	2,0 l	Bor za bolju oplodnju u idućoj vegetaciji	
	FitoKel Zn+Mn	2,0 l	Cink i mangan za formiranje pupova	
15 dana prije prvog mraza	Fertipen Cu	2,0 l		



Gnojidba:

1. Jesenska osnovna gnojidba

Microstart Bio NP 5-12 50-100 kg/ha Inkorporirati u tlo.

2. Kretanje vegetacije

Bioptimus 4,0 l/ha Aktivator tla, sadrži korisne mikroorganizme. Primijeniti fertiligacijom ili tretiranjem po tlu u trake.



Napomena:

► Za suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti (monilija, pepelnica, erwinia itd.) preporučujemo primjenu preparata na bazi *Bacillus subtilis* u dozi 2,5-3,0 l/ha.

BBCH

11

Pojava listova

19

Razmaknute ljušice

31

Razvoj listova

39

Cvatnja

60

69

81

Sazrijevanje plodova