

Paprika

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena	Napomena
Tretiranje tla prije sadnje	Racinet	3,0 l	Primijeniti za sprečavanje zaraze nematodama kroz sustav za navodnjavanje.	Ponoviti tretiranje svakih 14-21 dan do maksimalne doze od 6,0 - 8,0 l/ha.
	Humiterra ili Cripthum	10,0 - 20,0 l/ha; 4,0 - 8,0 l/ha	Za poboljšanje mikrobiološke aktivnosti i oslobađanje nedostupnih hranjiva iz tla.	Za kisela tla primijeniti Humiterra, a za tla alkalne reakcije primijeniti Cripthum.
Potapanje presadnica prije sadnje	BioEho	10 %	Preventivna zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti iz tla (<i>Phytophthora</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Verticillium</i> i dr.).	Potapanje sadnica u 10 % otopini.
Nakon presađivanja (kroz sustav za navodnjavanje kapanjem)	BN-Renov Tricco	0,5 kg	Gljivične i bakterijske bolesti iz tla.	Prva aplikacija nakon presađivanja. Tretirati odvojeno od ostalih tretmana.
	Lanaplus	1,0-3,0 kg/ha	Mikorizne gljive za bolji razvoj korijena i usvajanje hranjiva što utječe na povećanje prinosa.	Aplikacija 7 dana nakon presađivanja.
	FitoOrganomax 6-2-4	5,0 l	NPK + mikroelementi	Aplikacija 15 dana nakon presađivanja te ponoviti nakon 30 dana.
U vegetaciji	Biofor BioP	5,0 l	Mikrobiološko gnojivo za bolju ishranu fosforom.	
	FitoMil L-60 Eco	2,5 l	Plamenjača	
	FitoOrganomax 6-2-4	5 l	NPK + mikroelementi	
	Quilatum	2,0 l	Kalifornijski trips i lisne uši.	
	Litoman Ultra	3,0 kg		
	FitoFilm	0.10 %	Okvašivač	
	FitoMil L-60 Eco + Globber	1,5 l + 2,0 l	Plamenjača, lisne uši	
	FitoHeliosulfre	3,0 l	Pepelnica	
U vegetaciji	Quilatum	2,0 l	Kalifornijski trips	
	FitoBor	2,0 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju	
U vegetaciji	FitoAlgen F MnZn ili Kaishi	2,0 l	Aminokiseline	
Po potrebi ponoviti tretiranje nekoliko puta kroz vegetaciju, ovisno o pojavi štetnika i bolesti.				
Kod formiranja plodova	Fungisei	2,5 l	Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	
	Bramisoil	3,0 l	Lisne uši, mineri, tripsi	
	Shigeki	2,0 l	PK gnojivo s ekstraktom morskih algi i mikrohranjivima za bolje dozrijevanje plodova	
	Miles	3,0 l	Pepelnica	
	Belthirul	0,6 kg	Kukuruzni moljac	
Preporuka je uključiti gnojivo s kalcijem FitoKel CaO u svako tretiranje nakon formiranja plodova u dozi 2,0 l/ha radi čvrstoće plodova.				
U slučaju jačeg napada lisnih uši tretirati s Quilatum + Wetcit u dozi 2,0 l + 0,25 %.				



Gnojidba:

Priprema tla prije sadnje:

Zeo Min	400 kg/ha	Inkorporirati u tlo.
Microstart Bio NP 5-12	50 – 70 kg	Inkorporirati u tlo.
Ca'Verde Activa 4-3-3	500-800 kg/ha	Peletirano organsko gnojivo s inokuliranim korisnim mikroorganizmima

U ovisnosti o pH tla:

pH < 7 Humiterra	10,0-20,0 l/ha	Inkorporirati u tlo.
pH > 7 Cripthum	4-8 l/ha	Sustavom kap po kap ili zalijevanjem zone korijena



Napomena:

- ▶ U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l ili **Kaishi** 1,5-2,0 l.
- ▶ U slučaju pojave crvenog voćnog pauka i grinja, a pri pojavi prvih simptoma ili jedinki, tretirati sredstvom **Alvaxor** u dozi 2,0 – 3,0 l/ha ovisno o visini nasada.

