

## Rajčica, konzumna

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena
<b>Potapanje presadnica prije sadnje</b>	BioEho	10 %	Potapanje sadnica u 10 % otopini. Preventivna zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti iz tla ( <i>Phytophthora</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Verticillium</i> i dr.).
<b>Tretiranje nakon presađivanja</b> (kroz sustav za navodnjavanje kapanjem)	BN-Renov Tricco	0,5 kg	Gljivične i bakterijske bolesti iz tla.
<b>Prva aplikacija nakon presađivanja</b>	Humiterra ili Cripthum	10,0 - 20,0 l/ha; 4,0 - 8,0 l/ha	Oslobađanje nedostupnih hranjiva iz tla. <b>Humiterra</b> za kiselu tla, <b>Cripthum</b> za alkalna tla.
	Lanaplus	1,0-3,0 kg/ha	Mikorizne gljive potiču bolji razvoj korijen i bolje usvajanje hranjiva.
<b>7 dana nakon presađivanja</b>	Racinet	2 x 3,0 l	Nematode. Primijeniti 7 i 14 dana nakon presađivanja.
	Bioptimus	2 x 2,0 l	Rizobakterije, povećavanje dostupnosti hranjiva i rasta biljke. Primijeniti 15 i 30 dana nakon sadnje.
<b>Tretiranje nakon presađivanja prskanjem</b>	FitoMil L-60 Eco + Globber FitoMax L 90	1,5 l/ha + 2,0 l/ha 1,5 l/ha	Truleži korijena <i>Pythium</i> spp. i korijenovog vrata ( <i>Phytophthora</i> spp.).
<b>Tretiranje u fazi 5-7 listova</b>	FitoMil L-60 Eco	1,0 l	Plamenjača
	Fertipen Cu	1,0 l	
	FitoOrganomax 6-2-4	3,0 l	NPK gnojivo s mikroelementima i aminokiselinama
	FitoFilm	0,1 %	Okvašivač
<b>Tretiranje u fazi grananja</b>	Globber	2,0 l	Plamenjača
	FitoHeliosulfre	2,0 l	PK gnojivo sa sumporom. Pepelnica
	Belthirul	1,0 kg	Lisni miner
	Fitobor	1,0 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju
	Wetcit	0,25 %	Okvašivač. Sekundarno djelovanje na pepelnicu i štetnike.
<b>Tretiranje u fazi cvatnje</b>	FitoMil L-60 Eco	2,0 l	Plamenjača
	Fitobor	1,0 l	Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju
	Shigeki	3,0 l	Gnojivo s kalijem-nakupljanje šećera
<b>Tretiranje u fazi cvatnje</b>	Miles ili Fungisei	3,0 l	Baršunaste plijesni, koncentrična pjegavost, pepelnica, palež
	Bramisoil	3,0 l	Lisni miner
<b>Tretiranje u vegetaciji</b> (ponoviti u razmacima 7-10 dana)	FitoMil L-60 Eco	2,0 l	Plamenjača
	Shigeki	1,5 l	Biostimulator
	Miles ili Fungisei	3,0 l	Baršunaste plijesni, koncentrična pjegavost
	Resis Gold	3,0 l	Pepelnica
	Bramisoil	3,0 l	Lisni miner
	BioVeria	0,2 l	Štetnici, tretiranje ponoviti u razmacima 7-10 dana

**Gnojidba:****Priprema tla prije sadnje:**

Zeo Min	400 kg/ha	Inkorporirati u tlo.
Microstart Bio NP 5-12	50 - 70 kg	Inkorporirati u tlo.
Ca'Verde Activa 4-3-3	500-800 kg/ha	Peletirano organsko gnojivo s inokuliranim korisnim mikroorganizmima

**U ovisnosti o pH tla:**

<b>pH &lt; 7</b>	Humiterra	10,0-20,0 l/ha	Inkorporirati u tlo.
<b>pH &gt; 7</b>	Cripthum	4-5 l/ha	Sustavom kap po kap ili zalijevanjem zone korijena

**! Napomena:**

- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: **FitoAlgen F MnZn** u dozi 2,0 l ili **Kaishi** 1,5-2,0 l.
- U slučaju pojave crvenog voćnog pauka i grinja, a pri pojavi prvih simptoma ili jedinki, tretirati sredstvom **Alvaxor** u dozi 2,0 - 3,0 l/ha ovisno o visini nasada.
- Za suzbijanje lisnog minera na rajčici *Tuta absoluta* preporučujemo primjenu preparata **Bramisoil** primjenom kroz sustav kap na kap. Doza sredstva ovisi o fazi vegetacije i ide od 3,0 - 10 l/ha. U početnim fazama krenuti sa 3,0 l/ha a u punoj vegetaciji i do 10 l/ha. Sredstvo se primjenjuje isključivo kroz sustav kap na kap.

# FIToeko

